

1 категорія складності (низька складність)

Видалення новоутворень розміром **до 5 мм** у легкодоступних ділянках з мінімальною кровоточивістю:

- передпліччя
- гомілка
- зовнішня поверхня плеча
- зовнішня поверхня стегна
- спина
- живіт
- сідниці

2 категорія складності (середня складність)

Новоутворення розміром **від 5 до 10 мм** — у будь-якій ділянці тіла

АБО новоутворення будь-якого розміру, якщо вони розташовані у **зонах з помірною анатомічною складністю**:

- обличчя
- шия
- волосиста частина голови
- кисті та стопи
- молочні залози
- внутрішня поверхня плеча
- внутрішня поверхня стегна

АБО можливе часткове заглиблення в підшкірну клітковину незалежно від розміру та локалізації

3 категорія складності (висока складність)

Новоутворення розміром **понад 10 мм** — у будь-якій ділянці тіла

АБО новоутворення будь-якого розміру, якщо вони розташовані у **зонах з високою анатомічною складністю**:

- повіки
- губи
- вуха
- пахвові западини
- пахова ділянка
- міжпальцеві проміжки
- міжсіднична складка
- зовнішні статеві органи
- промежина

Підвищена кровоточивість під час процедури або заглиблення утворення в підшкірну клітковину, що виявлено під час проведення процедури, може призводити до зміни категорії складності в сторону зростання.

1 категорія складності (низька складність)

Видалення новоутворень розміром до 5 мм у легкодоступних ділянках з мінімальною кровоточивістю:

- передпліччя
- гомілка
- зовнішня поверхня плеча
- зовнішня поверхня стегна
- спина
- живіт
- сідниці

2 категорія складності (середня складність)

Новоутворення розміром від 5 до 10 мм — у будь-якій ділянці тіла

АБО новоутворення будь-якого розміру, якщо вони розташовані у зонах з помірною анатомічною складністю:

- обличчя
- шия
- волосиста частина голови
- кисті та стопи
- молочні залози
- внутрішня поверхня плеча
- внутрішня поверхня стегна


АБО можливе часткове заглиблення в підшкірну клітковину незалежно від розміру та локалізації

3 категорія складності (висока складність)

Новоутворення розміром понад 10 мм — у будь-якій ділянці тіла

АБО новоутворення будь-якого розміру, якщо вони розташовані у зонах з високою анатомічною складністю:

- повіки
- губи
- вуха
- пахвові западини
- пахова ділянка
- міжпальцеві проміжки
- міжсіднична складка
- зовнішні статеві органи
- промежина



Підвищена кровоточивість під час процедури або заглиблення утворення в підшкірну клітковину, що виявлено під час проведення процедури, може призводити до зміни категорії складності в сторону зростання.